



新型コロナワクチン接種後の症状が気になる方へ

～ 副反応かもしれないと思ったら ～ 小児（5～11歳）接種

12歳以上の方と同様、**接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等**、様々な症状が確認されていますが、**殆どが軽度又は中等度であり回復していること**、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。

※色々ご心配なこともあると思います。

接種について・接種時期については、下記ご参照の上

ご家族でご検討していただけたら幸いです。

厚生労働省

<https://www.mhlw.go.jp/content/000896558.pdf>

<https://www.mhlw.go.jp/content/000897513.pdf>

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/child/>

発現割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労
10～50%	頭痛、注射した部分の発赤や腫れ、筋肉痛、悪寒
1～10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

(注)接種後7日間にみられた様々な症状(1回目又は2回目のいずれか)

小児用ワクチンについてご存じですか？

小児（5～11歳）ワクチンは小児専用ワクチンです

小児（5～11歳）では、ファイザー社のワクチン

1回 10 μ g（0.2mL）を、通常、3週間の間隔で2回接種します。

12歳以上で使用するワクチンとは**別製剤**です。

小児専用の製剤として**濃度が調整**されています。

有効成分の量は、12歳以上で接種する量の**3分の1**になります。



@杉並すだクリニック <https://www.suginami-suda.com/>