



新型コロナワクチン 3回目接種について

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（6版）

主に追加接種・ファイザー/モデルナについて抜粋

<https://www.mhlw.go.jp/content/000868868.pdf>

3回目接種（追加接種）対象者 2回目接種から概ね8か月以上後、18歳以上の者。

実施期間 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施期間は
令和3年2月17日から令和4年9月30日までとされている。

初回接種（1、2回目接種）の完了から
原則8月以上の間隔をおいて1回接種すること。

逆算すると 3回目が8か月後の場合 1、2回目接種は1月30日までに終了予定
6か月後の場合 1、2回目接種は3月30日までに終了予定
と言えるかもしれません。

前後に他の予防接種を行う場合 原則として13日以上の間隔をおくこととし、
他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。

接種部位 通常、**三角筋に筋肉内接種**すること。
静脈内、皮内、皮下への接種は行わないこと。

ワクチンの種類



ファイザー社
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）

<https://www.mhlw.go.jp/content/000856250.pdf>

武田/モデルナ社
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）

<https://www.mhlw.go.jp/content/000868741.pdf>

ファイザー社



希釈前に室温に戻し、無菌操作で**希釈を行う**。

バイアルに生理食塩水 1.8mL を加え、
白色の均一な液になるまでゆっくりと転倒混和する。

振り混ぜないこと。

接種量は、**0.3 ミリリットル**とすること。

希釈後の液は、**2～30℃で保存し、希釈後6時間以内**に使用する。

希釈保存の際には、室内照明による曝露を最小限に抑えること。

直射日光及び紫外線 が当たらないようにすること。

武田／モデルナ社

希釈は不要であることに注意

接種量は、**0.25 ミリリットル**とすること。

※ポイント！

※3回目接種の場合、1回目・2回目 0.5 ミリリットルの半量を接種。

使用前であれば、**解凍後、遮光して 2～8℃で最長 30 日間、**

8～25℃で最長 1 2 時間 保存することができる。

いずれの場合も有効期間内に使用すること。

使用前に**常温に戻しておく**こと。

若年男性について



新型コロナウイルスに感染した場合に合併して発症する

心筋炎等の発生頻度よりは低いものの、ファイザー社コロナウイルス
修飾ウリジン RNAワクチン（SARS-CoV-2）に比べて**武田
／モデルナ社**コロナウイルス 修飾ウリジンRNAワクチン（SARS
-CoV-2）を**接種した後の心筋炎等の発 生頻度が高いことが確認**
されている

※ポイント！

※若年男性についてはファイザーをお勧めしたほうがよさそうです。

予防接種要注意者



予防接種要注意者の「基礎疾患を有する者」に関し、

抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者に
ついては、接種後に出血又は**挫傷**があらわれることがあり、

接種要注意者に該当する。

※挫傷とは

※身体表面には創(きず)がなく、内部の軟組織や臓器が損傷された状態

※皮下出血を起こしやすいので圧迫止血が必要。

ラテックスアレルギー

ファイザー・武田/モデルナのバイアルの栓には乾燥天然ゴム（ラテックス）は使用されていない。

接種後の経過観察



接種後にアナフィラキシーを呈することがあるため、接種後少なくとも 15 分間は被接種者の状態を観察する必要があること。また、過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を引き起こしたことがある者については、接種後 30 分程度、状態の観察をする必要があること。

※接種後は 15 分観察

※注意が必要な方は 30 分状態観察が必要



接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがあるため、過去に採血等で気分が悪くなる又は失神等を起こしたことがある者については、接種後 30 分程度、体重を預けられるような場所で座らせるなどした上で、なるべく立ち上がらないように指導し、被接種者の状態を観察する必要があること。

なお、予診の結果等から血管迷走神経反射による失神が生じる可能性が高いと考えられる者については、ベッド等に横たわらせて接種するといった予防策も考えられる。

※針刺しなど痛み刺激や過度な緊張により、一時的に血圧が下がり

貧血症状・一時的に意識消失等を起こす場合がある。

その時、転倒し打撲などの 2 次的事故が起こらない様、

また足を上げて横になると症状が改善するため

リスクのある方は予め横になって注射をお勧めします。

といった内容かと思えます。詳細は当院HPご参照下さい。

<https://www.suginami-suda.com/2021/02/26/2596/>



 **杉並すだクリニック**

東京都杉並区井草 1 - 1 6 - 4

03-3395-1192